

# KEGLESNITSOPERATION

## Forberedelse

Indgrebet foretages i lokalbedøvelse. Det er en god ide, at du ledsages af en pårørende, som venter i venteværelset.

## Indgrebet

Operationen varer ca. 5 min. og forberedelserne ca. 10 min.

Lokalbedøvelsen sprøjtes ind i livmoderhalsen. Du vil dog hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men der vil ikke være smerter. Mens du er bedøvet fjerner lægen med en varm klinge det yderste af livmoderhalsen, hvor de forandrede celler er påvist.

Det fjernede væv bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse på sygehuset.

## Efter indgrebet

Ophold i venteværelset 15 min, check for blødning før du går.

Du skal helst køres hjem (f.eks. af en pårørende) og holde dig i ro de første 2 døgn.

Du får mailsvar på vævsprøven ca. 2-3 uger efter indgrebet.

## Normale følger

**Smerter:** Det forekommer lette menstruationslignende smerter efter indgrebet. Som regel aftager smerterne efter nogle timer. Ved behov kan du tage 2 stk. tabl. Panodil.

**Blødning:** I den første tid efter indgrebet, vil der være lidt blødning eller brunligt udflåd. Dette aftager gradvist i løbet af 2-3 uger. Ofte ses at blødning tager til 6.-10. dag når sårskorpen opløses. For at undgå infektion skal du bruge bind, ikke tamponer, og du skal undgå samleje, karbad, svømmehal og havbad til blødningen er ophørt.

## Sygemelding

Vi vil tilråde, at du er sygemeldt 2-3 dage efter operationen, og at du undgår sport og tunge løft i 1 uge.

## Komplikationer

Indenfor de første uger kan der i sjældne tilfælde opstå unormal, kraftig blødning eller underlivsbetændelse. Indenfor klinikkens åbningstid ringer du, og vi ser på dig samme dag. Uden for klinikkens åbningstid, skal du kontakte vagtlægen og fortælle, at du har fået lavet keglesnit.

## Fremtiden

**Graviditet:** Keglesnit i livmoderhalsen har ingen betydning for din mulighed for at opnå en normal graviditet. Undersøgelser tyder på, at der er en lille øget risiko for en for tidlig fødsel efter keglesnit. Gennemsnitlig ca. 2 uger.

**Seksualliv:** Keglesnit i livmoderhalsen har ingen indflydelse på seksuallivet.

**Forebyggelse:** Undgå rygning, overvej HPV vaccination.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken.