

# UNDERSØGELSE AF PASSAGEFORHOLD I ÆGGELEDERNE

## HSU – Hystero-Salpingo-Ultrasonografi

### Formål

Formålet med HSU er, at undersøge om der er passage i dine æggeledere og skylle æggelederne igennem, så ”løse forhindringer” fjernes, hvorved passageforholdene bedres.

### Tidspunkt

HSU foretages på 7. - 11. dag efter menstruationens begyndelse. Dvs. du skal ringe til klinikken, så tæt på din første menstruationsdag, som muligt, for at aftale tid.

### Forberedelse

1 g Panodil 1 time før undersøgelsen.

### Indgrebet

Ultralyds-undersøgelsen foregår ved skanning gennem skeden, medens der sprøjtes væske via livmoderen ud igennem æggelederne. Gennemskylningen kan være forbundet med let ubehag (menstruationssmerte).

Først lægges lokalbedøvelse i livmoderhalsen.

Så føres et tyndt, blødt plastikrør (katheter) gennem livmoderhalsen op i livmoderen.

For at undgå tilbageløb af kontrastvæske fyldes væske i en lille ballon, som sidder i spidsen af kateteret.

Herefter sprøjtes 10 ml lokalbedøvende væske (Carbocain) gennem kateteret.

Væsken passerer ud gennem æggelederne, hvis disse er åbne. Dette ses ved skanning.

### Efter indgrebet

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt og en del af den lokalbedøvende væske kan løbe ud af skeden.

Der er en lille risiko for infektion, men denne skønnes at være under 1%.

Ved problemer kontakter du klinikken i åbningstiden.

### Svar på undersøgelsen

Du/I får umiddelbart, i forbindelse med undersøgelsen, resultatet at vide.

Den videre behandling planlægges herefter.

Hvis der er yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte klinikken.