

UNDERSØGELSE AF PASSAGEFORHOLD I ÆGGELEDERNE

HSU – Hystero-salpingo-ultrasonografi

Formål

Formålet med HSU er at undersøge, om der er passage i dine æggeledere og skylle æggelederne igennem, så "løse forhindringer" fjernes, hvorved passageforholdene bedres.

Tidspunkt:

HSU foretages på 7-11. dag efter menstruationens begyndelse, d.v.s. du skal ringe til klinikken, så tæt på din første menstruationsdag som muligt for at aftale tid.

Forberedelse:

1 g Panodil/Kodimagnyl ½-1 time før undersøgelsen.

Indgrebet:

Ultralyds-undersøgelsen foregår ved skanning gennem skeden, mens der sprøjtes væske via livmoderen ud igennem æggelederne. Gennemskylningen kan være forbundet med let ubehag (menstruationssmerte).

Først lægges lokalbedøvelse i livmoderhalsen.

Der føres et tyndt, blødt plastikrør (katheter) gennem livmoderhalsen op i livmoderen.

For at undgå tilbageløb af kontrastvæske fyldes væske i en lille ballon, som sidder i spidsen af kateteret.

Herefter sprøjtes 10 ml lokalbedøvende væske (Carbocain) gennem kateteret. Væsken passerer ud gennem æggelederne, hvis disse er åbne. Dette ses ved skanning.

Efter indgrebet:

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt og en del af den lokalbedøvende væske kan løbe ud af skeden. Der er en lille risiko for infektion, men denne skønnes at være under 1%. Ved problemer kontakter du klinikken.

Svar på undersøgelsen:

Du/I får umiddelbart i forbindelse med undersøgelsen resultatet at vide. Den videre behandling planlægges herefter.

Hvis der er yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte klinikken.

Gynækolog Gitte Glavind

Borgvold 14B - 7100 Vejle - tlf.: 75840500

Opdateret juli 2020
Revideres juli 2023